


ГІГІЄНА




ЗАПОБІГАННЯ ДОСТУПУ ПАТОГЕНІВ (Хвороботворні бактерії) НА ФЕРМУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗОВНІШНЬОГО ЗАХИСТУ ВІД ЗАХВОРИВАНЬ

- Обмежте кількість відвідувачів до мінімуму, розмістіть гостьову книгу біля входу до корівника в зв'язку з обмеженням доступу через захворювання.
- Забезпечити відвідувачів захисним одягом та взуттям.
- Не входьте в транспортний засіб для перевезення тварин із в цю роботу до ферми. Якщо водієві необхідно зайти до корівника, забезпечити його захисним взуттям ферми.
- Не надавайте притулок шкідливим тваринам. Слідкуйте за тим, щоб довкола корівника не було непотрібних речей, а з його сторін не було рослинності.
- Запобігайте проникненню шкідливих тварин у кормосховище та зберігайте корм у закритих контейнерах окремо від ґрунту.
- Не допускайте в корівник домашніх тварин (кішок і собак).

ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ЗБУДНИКА ХВОРОБИ НА ФЕРМІ З ДОПОМОГОЮ ВНУТРІШНЬОГО ЗАХИСТУ ВІД ЗАХВОРИВАНЬ

- Розплануйте порядок роботи від молодшої тварини до старшої і таким чином, щоб хворих тварин лікували в останню чергу.
- Повинно бути достатньо місць для миття взуття та рук! Мінняйте чоботи між різними відділами/групами, якщо не вистачає місць для миття чоботів.
- Не використовуйте робочі інструменти одночасно в різних відділах/групах, якщо немає можливості їх мити в проміжках.
- Уникайте відвідування кормового місця, ніколи не ходіть вздовж стійла в брудних чоботях.



ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ДОЇННЯ ДО І ПІСЛЯ ДОЇННЯ

- Добре просушіть місця для лежання корів та поголіть волоссяний покрив вимені, щоб було легше підтримувати вим'я в чистоті.
- Сплануйте послідовність доїння: спочатку доїть корів зі здоровим вим'ям, а в останню чергу доїть корів, які потребують особливої уваги, наприклад корів, у яких спостерігається перевищення соматичних клітин, і тих, які отримують ліки.
- Руки доярки/дояра завжди повинні бути чистими.
- Перед доїнням проводиться очищення тварин групами не більше 2-3 тварин.
- Використовуйте ємність для перших обприскувань, не розпилюйте речовину на землю.
- Після доїння використовуйте дезінфікуючий розчин для обробки сосків методом занурення і будьте уважні у його використанні.
- У режимі автоматичного доїння перевірте чистоту сосків дійних корів за допомогою роботи перед тим, як прикріплювати доїльні стакани. Подбайте про функціональність та гігієну мийної системи: перевіряйте, чи достатньо миючого засобу та регулярно мінняйте щітки та гумові ніпеля. Переконайтеся, що дезінфікуючого розчину для обробки сосків методом занурення достатньо і що розчин торкається знімачів.
- Підтримуйте чистоту і порядок у молочному блоці: регулярно мийте підлогу, не залишайте речі на підлозі чи в раковині. Завжди мийте чоботи перед тим, як йти в молочний блок!



WALTER EHRSTRÖMIN SÄÄTIÖ



Maitohygienialiitto



Maa- ja metsätalousministeriö